



ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เลขที่คำขอ 64100265 วันที่ยื่นคำขอ 19 กุมภาพันธ์ 2564
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดสี หรือ Sawi Pineapple หรือ Subparod Sawi
รายการสินค้า สับปะรด
ผู้ขอขึ้นทะเบียน วิสาหกิจชุมชนสับปะรดสี ตำบลทุ่งระยะ
ที่อยู่ หมู่ 11 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสี จังหวัดชุมพร 86130

1. คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

สับปะรดสี หรือ Sawi Pineapple หรือ Subparod Sawi หมายถึง สับปะรดพันธุ์ควีน ผลทรงกระบอก จุกเล็กตั้งตรง ตาเล็กค่อนข้างนูน ร่องตาลึก เมื่อสุกจัดเปลือกมีสีเหลืองถึงส้มสม่ำเสมอทั้งผล เนื้อแห้ง กรอบ สีเหลืองเข้มสม่ำเสมอ เส้นใยน้อย แกนผลกรอบ กลิ่นหอม รสชาติหวาน ปลูกในพื้นที่อำเภอสี จังหวัดชุมพร

ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์สับปะรด : พันธุ์ควีน

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปทรง ทรงกระบอก จุกเล็กตั้งตรง น้ำหนักตั้งแต่ 0.4 – 3 กิโลกรัม
- เปลือกผล ผลแก่มีสีเขียวเข้ม เมื่อสุกจะมีสีเหลืองปนเขียว และเมื่อสุกจัดจะมีสีเหลืองถึงส้ม สม่ำเสมอทั้งผล ตาเล็กค่อนข้างนูน ร่องตาลึก
- เนื้อ เนื้อแห้ง กรอบ สีเหลืองเข้มสม่ำเสมอ เส้นใยน้อย แกนผลกรอบรับประทานได้ มีกลิ่นหอม
- รสชาติ หวาน

(3) ลักษณะทางเคมี

- ค่าความหวาน อยู่ระหว่าง 14 - 20 องศาบริกซ์

2. กระบวนการผลิต

วัตถุดิบ

หน่อพันธุ์ของสับปะรดสีต้องเป็นสายพันธุ์ควีน ที่มาจากต้นพันธุ์คุณภาพดีในพื้นที่อำเภอสี จังหวัดชุมพร

การปลูก

- (1) คัดเลือกหน่อพันธุ์จากต้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เลือกหน่อที่มีความสมบูรณ์ ลักษณะอวบ สีเขียวสด ความสูงประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร และเลือกขนาดใกล้เคียงกันปลูกในแปลงเดียวกัน
- (2) เตรียมพื้นที่ปลูก โดยไถตะและตากดินทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน จากนั้นไถแปรให้ดินละเอียด ทำแนวปลูกให้มีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 1.2 - 1.3 เมตร เว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 30 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่
- (3) สามารถปลูกได้ตลอดปี ปลูกได้ทั้งระบบพืชเดี่ยวและปลูกแซมพืชหลัก นิยมปลูกแบบแถวเดี่ยว โดยปลูกหน่อพันธุ์ลงหลุมลึกประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร ให้หน่อตั้งตรง แล้วกลบดินให้แน่น

การดูแลรักษา

- (1) การให้น้ำจะอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก แต่ในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ควรให้น้ำสัปดาห์ละครั้งอย่างเพียงพอ
- (2) การใส่ปุ๋ย ควรให้อย่างน้อย 2 ช่วง คือระยะบำรุงต้นและระยะบำรุงผล โดยใส่ปุ๋ยให้ชิดโคนต้นหรือบริเวณกาบใบล่าง ขณะที่ดินมีความชื้นหรือกาบใบมีน้ำเพียงพอ กรณีใส่ปุ๋ยเมื่อไม่มีความชื้นเพียงพอต้องให้น้ำเพื่อช่วยละลายปุ๋ยให้หมด หรือเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- (3) ควรกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นตรวจแปลงปลูก หากพบโรคและแมลงรีบดำเนินการกำจัด โดยใช้วิธีจัดการตามความเหมาะสมและไม่ส่งผลเสียต่อสับปะรด
- (4) การบังคับดอก โดยใช้สารเคมีเพื่อเร่งการออกดอก เช่น กรดแนพทาไลน์ออกซิติก หรือแคลเซียมคาร์ไบด์ เป็นต้น หยอดในยอดสับปะรดขณะที่มีน้ำขังอยู่ โดยเลือกต้นที่สมบูรณ์ มีลักษณะโคนต้นอวบใหญ่ ใบกว้างหนา
- (5) ก่อนการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีแสงแดดจัด ควรมีการคลุมผลสับปะรดด้วยฟางหรือหญ้า หรือวัสดุอื่น เพื่อป้องกันแดดเผาผลสับปะรด ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของสับปะรด

การเก็บเกี่ยว

- (1) สับปะรดสี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
- (2) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวประมาณ 135 - 150 วัน หลังจากการใช้สารบังคับดอก หรือกรณีไม่บังคับดอก เก็บเกี่ยวประมาณ 120 - 150 วันหลังออกดอก หรือสังเกตว่าผลมีความสุกเหลืองประมาณร้อยละ 25 ของผล โดยตัดให้มีก้านผลและจุกติดอยู่
- (3) หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณ 2 - 3 เดือน ทำการหักหน่อจากต้นเดิม ให้เหลือประมาณ 2 - 3 หน่อต่อต้น จากนั้นจัดการบำรุงรักษาให้ต้นมีความสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อใช้ผลิตสับปะรดรุ่นถัดไป

การบรรจุหีบห่อ

- (1) รายละเอียดบนฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ ให้ประกอบด้วยคำว่า “สับปะรดสี” หรือ “Sawi Pineapple” หรือ “Subparod Sawi”
- (2) ให้ระบุชื่อและสถานที่ผลิตหรือจัดจำหน่าย หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อผู้ผลิต/ชื่อสวน ที่อยู่ และเบอร์โทร ระบุขนาดตามน้ำหนักผล เป็นต้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอสวีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 10 องศา 29 ลิปดาเหนือ และเส้นลองจิจูดที่ 99 องศา 11 ลิปดาตะวันออก เป็นที่ราบริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 40 - 60 เมตร พื้นที่เป็นที่ราบสูงทางทิศตะวันตกและลาดต่ำไปทางทิศตะวันออกจนกระทั่งจรดทะเล มีภูเขาและป่าเบญจพรรณหลากหลายชนิด ทางด้านตะวันตกมีภูเขายาวจากเหนือไปได้ เรียกว่าเทือกเขาตะนาวศรี ด้านตะวันออกส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมฝั่งทะเลทั่วไป สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขา และที่ราบต่ำ ลักษณะดินในอำเภอสวีส่วนใหญ่เป็นดินลิกปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดจัดมาก (pH 4.5 - 5) สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด การระบายน้ำดี จากลักษณะดินดังกล่าว พื้นที่อำเภอสวีจึงเหมาะสมกับการปลูกสับปะรดสวีที่สามารถทนต่อดินกรดได้ อีกทั้งสภาพดิน มีความอุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุริมเชิงเขา และแร่ธาตุจากแหล่งกำเนิดลำน้ำย่อยที่เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลผ่านภูเขา ถ้ำหินปูน และคลองหินต่างๆ

ลักษณะภูมิอากาศ

อำเภอสวี เป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูกาลแบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ซึ่งจะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงมกราคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านมวลอากาศมีความชื้นสูง เมื่อปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้เกิดฝนตกชุกตลอดพื้นที่ โดยช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกมากกว่าช่วงอื่น ๆ เนื่องจากพื้นที่อำเภอสวีอยู่ติดกับอ่าวไทยและไม่มีภูเขาสูงปิดกั้น จึงได้รับมรสุมเต็มที่ มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,600 มิลลิเมตรต่อปี

ด้วยลักษณะสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศดังกล่าว ส่งผลให้สับปะรดสวี ที่ปลูกในพื้นที่อำเภอสวีสามารถเจริญเติบโตได้ดี มีเนื้อเหลืองสม่ำเสมอ เนื้อแห้ง หวานกรอบ กลิ่นหอม และแกนผลมีความกรอบรับประทานได้

ประวัติความเป็นมา

สับปะรดสวี มีการปลูกในพื้นที่มาอย่างยาวนาน โดยมีจุดเริ่มต้นมาจาก พระยาจตุรราชโกศการ อดีตเจ้าเมืองหลังสวน เป็นผู้นำพันธุ์สับปะรดเข้าจากเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย และมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอลังสวน จังหวัดชุมพรนำไปปลูก ในระยะแรกเรียกว่า หยานัสฝรั่ง หรือ สับปะรดฝรั่ง ต่อมาเมื่อเกิดปัญหาโรคไหม้พรวัวและยางพาราตกต่ำ ชาวบ้านจึงเริ่มหันมาปลูกสับปะรดแซมในสวนมะพร้าวและสวนยางพารา เป็นช่องทางสร้างรายได้เสริม และมีการปลูกสับปะรดกันอย่างแพร่หลายมากในพื้นที่อำเภอสวี จึงนิยมเรียกชื่อสับปะรดชนิดนี้ตามแหล่งที่ปลูกว่า “สับปะรดสวี”

สับปะรดสวีนิยมปลูกในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านจึงนิยมนำสับปะรดมาใช้ในการทำบุญเลี้ยงพระ และเตรียมไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ด้วยรสชาติหวานกรอบ หอมเป็นเอกลักษณ์ จึงมีการกล่าวถึงรสชาติจนทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งมีการวางจำหน่ายสับปะรดสวี บริเวณริมถนนหมายเลข 41 ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ทำให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้รู้จักสับปะรดสวีเพิ่มมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นผลไม้ของฝากขึ้นชื่อจาก

อำเภอสี จังหวัดชุมพร และได้นำเอกลักษณ์นี้มารวมไว้ในคำขวัญประจำอำเภอว่า “พระธาตุเก่าแก่ กาแฟเลิศล้ำ ระกำหวานดี สตรีสวยสด สับปะรดหวานกรอบ เทียบรอบหมู่เกาะสี” ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2529 เริ่มมีการจัดงานประจำปีของอำเภอสี ชื่องานประเพณีว่า “สับปะรดสี” โดยมีสับปะรดมาวางจำหน่ายและประชาสัมพันธ์จนเป็นที่รู้จักมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน

4. ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การผลิตสับปะรดสี ครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอสี จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามแผนที่


5. การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

- (1) สับปะรดสี ต้องปลูกและผลิตในเขตพื้นที่ที่กำหนด ตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าสับปะรดสี รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้

6. เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

- (1) ให้มีการจัดทำทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดสี
- (2) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดสี และดำเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบ ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ สับปะรดสวี่



ขอบเขตพื้นที่การผลิตสับปะรดสวี่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสวี่ จังหวัดชุมพร